

## INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Le è stato prescritto Lixiana, un medicinale anticoagulante, che fluidifica il sangue e aiuta a prevenire la formazione di coaguli. È importante usare il medicinale seguendo esattamente le istruzioni del medico.

- Se dimentica una dose, la prenda immediatamente e continui poi il giorno seguente come al solito. Non prenda nello stesso giorno una dose doppia rispetto a quella prescritta.

- Non inizi a prendere altri medicinali (inclusi quelli da banco) senza consultare il medico.
- Non interrompa il trattamento con Lixiana senza consultare il medico perché questo può aumentare il rischio di sviluppare coaguli di sangue.
- Legga il foglio illustrativo accluso ad ogni confezione di Lixiana.

## QUANDO CONSULTARE IL MEDICO

### RISCHIO DI EMORRAGIA

L'assunzione di un medicinale anticoagulante come Lixiana può aumentare il rischio di emorragia. È importante perciò prestare attenzione ai possibili segni e sintomi di emorragia e contattare **immediatamente** il medico se si notano:

- lividi o emorragia sotto la pelle
- presenza di sangue nelle urine
- emissione di sangue con la tosse
- emissione di sangue o materiale che somiglia a caffè macinato con il vomito

- sanguinamento dal naso o ferite che sanguinano per molto tempo
- feci color catrame
- capogiri o mal di testa improvviso
- stanchezza inspiegabile
- sanguinamento vaginale anomalo, incluse mestruazioni più abbondanti o prolungate

Informi il medico se si manifestano sintomi insoliti.



IT 112140

## SCHEDA DI ALLERTA PER IL/LA PAZIENTE

**Lixiana**<sup>®</sup>

compresse rivestite con film

**edoxaban**

Porti sempre con sé questa scheda.

La consegni all'operatore sanitario, farmacista, chirurgo o dentista prima di qualsiasi trattamento o intervento medico.

## INFORMAZIONI SUL/LA PAZIENTE

Nome del/la paziente:

.....

Data di nascita: .....

In caso di emergenza, si prega di contattare:

Nome: .....

N. di telefono:

.....

## DATI RELATIVI AL TRATTAMENTO

(da completare a cura del medico)

Lixiana è stato prescritto a una dose una volta al giorno di:

..... mg

Data di inizio della terapia:

..... / ..... (mm/aa)

Gruppo sanguigno: .....

Altre terapie farmacologiche/  
condizioni cliniche:

.....

.....

.....

## INFORMAZIONI SUL MEDICO PRESCRITTORE

Per maggiori informazioni o in caso di emergenza, si prega di contattare:

Nome del medico:

.....

Numero di telefono, timbro dello studio medico:

Firma del medico:

.....

## INFORMAZIONI PER GLI OPERATORI SANITARI

- Lixiana è un anticoagulante orale, inibitore del fattore Xa.
- Quando ci si deve sottoporre a una procedura invasiva, si deve interrompere il trattamento con Lixiana almeno 24 ore prima e usare opportuna cautela.
- Lixiana può aumentare il rischio di emorragia. In caso di emorragia clinicamente significativa, interrompere immediatamente il trattamento.

- I test di coagulazione quali INR, tempo di protrombina (PT) e tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT) non sono utili per misurare l'effetto di Lixiana. Tuttavia, un dosaggio calibrato dell'anti-fattore Xa può essere d'aiuto nella decisione clinica.

Per maggiori informazioni, consultare il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Cod. 113632